

EVALUATION DES CONNAISSANCES ARMV-RP

NOM
PRENOM

1. La thrombopénie induite par l'héparine est

- A. Plus à risque thrombotique qu'hémorragique
- B. Surtout observée en contexte médical
- C. Associée à une perte très importante du nombre de plaquettes (> 80%)
- D. Une urgence thérapeutique

2. Les Anticoagulants Oraux Directs sont

- A. Aussi rapides que les anticoagulants injectables
- B. D'action irréversible sur les facteurs Xa ou IIa
- C. Moins bien tolérés chez les sujets âgés
- D. A risque hémorragique équivalent aux AVK

3. Les Anticoagulants Oraux Directs sont

- A. Contre-indiqués en cas de clairance rénale < 30 ml/min
- B. Contre-indiqués chez la femme enceinte
- C. Contre-indiqués chez les sujets âgés de plus de 80 ans
- D. Contre-indiqués chez les sujets de moins de 18 ans

4. Les Anticoagulants Oraux Directs et les temps de coagulation

- A. Le Rivaroxaban allonge surtout le TQ
- B. L'Apixaban allonge surtout le TCA
- C. Le Dabigatran allonge surtout le TCA
- D. Le Temps de Thrombine est perturbé par tous les AOD

5. Les Anticoagulants Oraux Directs

- A. Doivent être arrêtés avant une extraction dentaire
- B. Doivent être relayés par une HBPM avant une intervention chirurgicale
- C. Sont dialysables en cas de surdosage
- D. Sont neutralisables par la perfusion de CCP comme les AVK

Réponses

1. A D
2. A
3. A B D
4. A C
5. D